動脈硬化プラークの分子イメージング

田原 宣広, 田原 敦子, 新田 良和, 児玉 紀洋, 溝口ミノリ, 今泉 勉

Tahara N, Tahara A, Nitta Y, Kodama N, Mizoguchi M, Imaizumi T: **Molecular imaging of atherosclerotic plaque.** J Jpn Coron Assoc 2011; 17: 114-120

I. はじめに

近年, 生活習慣や食生活の欧米化に伴い, 肥満, 脂質異常, 高血圧, 耐糖能異常が急増し, 動脈硬化を基盤とする脳血管疾患や冠動脈疾患の発症頻度が増えている。動脈硬化は, 脳梗塞や急性冠症候群など重篤な合併症を引き起こし, その死亡率は悪性新生物と並んでわが国の死因の上位を占めている。近年, 本邦は類をみない高齢化社会へと突入しており, 今後も動脈硬化性疾患の急激な増加が予想される。したがって, 動脈硬化を早期から正確に発見し, その合併症である脳梗塞や急性冠症候群を予防・治療していくことは, われわれ循環器医にとって, きわめて重要な臨床課題と考えられる。

近年, 動脈硬化は慢性的炎症性疾患と認識され, 炎症が病変の発症・進展に関与し, プラークの破綻にも関与しているとされている。破綻しやすいプラークは不安定プラークと呼ばれ, 脂質や炎症細胞成分に富んでいることが知られている。プラークの不安定性を正確に評価し, その経時的变化を評価できるモダリティの開発が望まれており, multislice computed tomography (MSCT), magnetic resonance imaging (MRI), 血管内超音波 (intravascular ultrasound: IVUS), 血管内視鏡, 光干渉断層法 (optical coherence tomography: OCT) などを用いて, プラークの性状を評価する試みがなされている。なかでも, 脂質が豊富なプラークを検出する試みが広く臨床応用されているが, 病変局所が実際に炎症性変化を伴った不安定プラークであるかについての評価は困難である。

近年, ^{18}F 標識 fluorodeoxyglucose (FDG) をトレーサーとしたポジトロン断層撮影 (positron emission tomography: PET) が炎症病変を描出可能な画像診断法として応用されている。本稿では, 新しい分子イメージングとして発展してきた FDG-PET を用いて頸動脈~大動脈~冠動脈の血管壁や動脈硬化プラークにおける炎症の活動性や範囲の評価, 薬物療法の効果をモニタリングする試みについて解説する。

II. 炎症と動脈硬化

1980年代後半に急性心筋梗塞の責任病変の大半は発症前の冠動脈造影で中等度以下の狭窄度を示すという報告がなされ, 冠動脈に存在した脆弱な不安定プラークが突然破綻し, 内容物が血流に接触することで引き続き血栓が形成されることにより冠血流が急激に制限されるメカニズムが明らかになった¹⁻³。動脈硬化病変から直接的に得られた材料を用いて組織学的解析が行われ, 破綻しやすい不安定プラークは脂質が豊富で周囲を覆う線維性被膜が薄く, リンパ球やマクロファージなどの炎症細胞が浸潤していることが病理学的特徴として明らかにされている。また, ヒトの動脈硬化巣で慢性炎症細胞であるリンパ球やマクロファージが活性化状態を示し, 末梢血中の高感度C反応性蛋白 (C-reactive protein: CRP) や炎症性サイトカインなど臨床的炎症マーカーが急性冠症候群など動脈硬化性疾患のリスク評価に有用であることが報告されている⁴⁻⁶。

血管内皮障害に引き続いて起こるマクロファージの集簇は, 動脈硬化プラークにおいて最も重要な病理組織学的所見であり, プラーク形成のみでなく不安定化にも深く関わっていると考えられている^{7, 8}。また, 急性冠症候群の発症に直接的な原因となる血栓形成においても, 炎症細胞の関与が示唆されている⁸。プラーク内の脂質コアでは, 酸化LDLがスカベンジャー受容体などを介してマクロファージに取り込まれた後, コレステロールエステルを蓄積した泡沫細胞になる。血管内膜における泡沫細胞の増加が内膜肥厚やプラーク形成を進展させており, 泡沫細胞の継続的な細胞死から壊死性コアが形成され, 動脈硬化プラークを脆弱化へと導く。酸化LDLを貪食したマクロファージにより活性化されたT細胞はインターフェロン- γ など種々の炎症性サイトカインを分泌する。また, マクロファージから分泌されるマトリックスメタロプロテアーゼ (matrix metalloproteinase: MMP) によって細胞外マトリックスの分解が促進され, 脂質コアの増大や線維性被膜の菲薄化が起これ, プラークは不安定化する。また, プラークの栄養血管 (vasa vasorum) の発達は, 内膜マクロファージ量および心血管イベントに相関

久留米大学医学部内科学講座 心臓・血管内科部門 (〒830-0011 福岡県久留米市旭町 67 番地)

図1 FDG集積を示す有症候性頸動脈硬化のPET/CT画像と内膜剥離術標本
 上段：A：FDG-PET. B：造影CT. 頸動脈硬化プラーク. C：造影CTとFDG-PETの融合画像. 赤矢印：動脈硬化プラークに集積したFDG.
 下段：内膜剥離術標本から得られた病理組織像. FDG集積はマクロファージの集簇に一致していた.
 (文献14より引用. 2002 American Heart Association, Inc. All rights reserved.)

していることが報告され、*vasa vasorum*の脆弱性を示すプラーク内出血もプラークの不安定性を示すとされている^{9, 10}。プラークの安定性が細胞外マトリックス、構成細胞、脂質含量などの細胞成分に依存していることが明らかとなり、動脈硬化の診断・治療において病変の大きさや血管内腔の狭窄度などの量的な要素よりもプラークの被膜厚や構成成分などの質的な要素が重要視されるようになってきた^{11, 12}。

III. 動脈硬化プラークの画像診断

動脈硬化病変の評価は、古典的な動脈造影が gold standard であるが、狭窄度など動脈内腔の情報が得られるものの、血管内腔の濃淡を二次元画像で描出することから動脈硬化プラークや血管壁の性状に関する情報は得られなかった。また、動脈硬化プラークの生成・進展に伴い血管リモデリングが起り、動脈造影では明らかな狭窄として描出することができない例がある。動脈造影の限界を補う目的で、さまざまな補助画像診断法が臨床の場で利用されている。近年、動脈造影以外の画像診断法はMSCTやMRIなど非侵襲的なモダリティが発達している。また、IVUS、血管内視鏡、OCTなど侵襲的ではあるが空間分解能に優れたカテーテルベースのモダリティも発達している。近年、これらのモダリティを用いてプラークの組織性状から不安定プラークを識別する試みが臨床応用されている。しかしながら、これらの検査法も病変局所が実際に炎症性変化を伴った活動性病変であるか否かを判断できるモダリティではない。

IV. FDG-PET

医用工学と画像解析技術の進歩により新しい分子イメージングとして高解像度のPETが発展してきた。PETは組織の代謝機能を表す画像を得ることができ、FDG-PETはブドウ糖代謝画像として臨床応用されている。FDGはブドウ糖誘導体でブドウ糖代謝の盛んな組織に集積し、そのFDGの集積を映像化することによりブドウ糖代謝を評価することができる。癌細胞はブドウ糖代謝が

亢進しており、FDGは癌細胞に取り込まれ、それを断層撮影することにより非侵襲的に癌を検出することができる。また、炎症細胞もブドウ糖代謝が亢進しており、活動性のある炎症病変にもFDGが集積することが知られている。この特性を利用してFDG-PETが炎症細胞を豊富に有する不安定プラークを描出する報告がなされている¹³⁻¹⁵。ウサギを用いた動物実験ではFDGの集積が動脈硬化病変の炎症細胞浸潤に一致し¹³、FDG陽性のヒト頸動脈病変から剥離された内膜の病理所見ではマクロファージが豊富な病変であったことが示されている^{14, 15}(図1)。同様の機序により、大動脈炎症候群などの血管炎についても活動性が高い病変にFDGが集積することが知られている¹⁶。これらの報告からFDG-PETは血管壁やプラークにおける炎症の活動性や範囲の評価、更には治療効果をモニタリングできると考えられる。これまでは、FDG-PETの空間分解能の問題から頸動脈や大動脈病変への応用に限られていたが、高分解能のMSCTとの融合画像により、冠動脈病変への応用も報告されてきている⁸。

V. 活動性の高い炎症血管と動脈硬化プラークの検出

血管の炎症性疾患である大動脈炎症候群例において血清の炎症反応が高値を示しているもCT等の通常検査では病変局所の活動性は明らかではない。そこでわれわれは大動脈炎症候群例に対し、FDG-PETを用いて大動脈炎の活動性や範囲の評価を行い、ステロイド治療の適否について検討している。動脈炎症の活動性が高い例では、図2B・C、図3Aに示すように血管壁に一致してFDGが高度に集積していることが明らかである。次に、FDGが局所的に集積した動脈硬化病変の横断像を図4に示す。PETと造影CTの融合画像によりFDGが動脈硬化性プラークに一致して集積し、プラーク炎症の活動性を示していることがわかる¹⁷。頸動脈エコーとFDG-PETとを対比させた検討では、FDGが集積する安定プラーク(図5A)とFDGが集積しない不安定プラーク(図5B)の鑑別が可能である¹⁸。また、頸動脈エコーで動脈硬化を認めない例においても炎症を認める例(図5C)が存在し、動脈硬化も炎症

図2 大動脈炎症候群のPET/CT画像
 A: 治療前の造影CT. 血管壁の肥厚, 胸部大動脈の狭窄を認める. B: 治療前のFDG-PET. C: 治療前の造影CTとFDG-PETの融合画像. 赤矢印: 血管壁に集積したFDG.
 (文献16より改変引用)

図3 大動脈炎症候群に対するステロイド治療前後のFDG-PET画像
 A: 治療前, B: ステロイド治療後. 赤矢印: 血管壁に集積したFDG, 白矢印: ステロイド治療により炎症所見は改善, FDGの集積が軽減している.
 CRP: C-reactive protein, ESR: erythrocyte sediment rate
 (文献16より改変引用)

図4 FDG集積プラークの典型例
 A: FDG-PET, B: 造影CT, C: PETとCTの融合画像(PET/CT). 黒矢印: プラーク, 白矢印: FDG. 頸動脈プラークに一致してFDGが強く集積している.
 (文献17より改変引用)

図5 頸動脈エコーとFDG-PETとの対比
 A: FDG集積のある不安定プラーク, B: FDG集積のない安定プラーク,
 C: 動脈硬化を認めず, FDG集積を認める例, D: 正常例
 (文献18より改変引用)

図6 食事・スタチン治療前後のFDG-PET画像
 上段: 食事治療前後のFDG-PET画像とFDG-PETとCT合体画像(PET/CT). 食事治療により頸動脈や大動脈のFDG集積は変化ないか, または一部集積が強くなっている. PET/CTにおいてもプラークにおけるFDGの集積強度は変化を認めない(赤矢印).
 下段: スタチン治療前後のFDG-PET画像とFDG-PETとCT合体画像(PET/CT). スタチン治療により頸動脈や大動脈のFDG集積は軽減している. PET/CTにおいて左頸動脈プラークのFDG集積(黒矢印)はほとんど消失している.
 (文献17, 20より引用)

もともに認めない例(図5D)よりもインスリン抵抗性の指標であるHOMA指数(homeostasis model assessment of insulin resistance: HOMA-IR)が有意に高い結果であった^{17, 18)}. 動脈硬化の発症・進展にはインスリン抵抗性や炎症が関与していることが示唆される. FDG-PETを用いることにより動脈エコーやCTなどの従来のモダリティのみではわからなかった血管壁や動脈硬化プラークの炎症が

非侵襲的に可視化され, 活動性や範囲の評価, さらには治療法の選択にも有用であると考えられた.

VI. 動脈硬化の炎症に関与する因子

動脈硬化の発症・進展に炎症が関与していることが注目されているが, 動脈硬化の炎症にどのような因子が関与しているかは明らかではない. そこで, われわれはFDG-

表1 動脈炎症に関与する因子(ステップワイズ重回帰分析)

パラメーター	β	SE	p value
ウエスト径	0.346	0.001	<0.001
降圧薬内服 [#]	0.171	0.023	<0.001
頸動脈内膜中膜複合体厚	0.146	0.077	<0.001
HDL コレステロール	-0.086	0.001	<0.01
HOMA 指数 [†]	0.143	0.043	<0.05
高感度 CRP [†]	0.119	0.017	<0.05

R²=0.44

HDL: high-density lipoprotein, HOMA: homeostasis model assessment of insulin resistance, CRP: C-reactive protein

非内服=0, 内服=1

[†]Log-transformed value was used.

β: standardized regression coefficients, SE: standard error.

(文献 16, 19 より改変引用)

表2 動脈硬化に関与する因子(ステップワイズ重回帰分析)

パラメーター	β	SE	p value
年齢	0.369	0.064	<0.001
動脈炎症	0.143	0.062	<0.001
収縮期血圧	0.192	0.001	<0.01
性別 [†]	-0.108	0.043	<0.01
スタチン内服 [#]	0.129	0.017	<0.05

R²=0.36

[†]Log-transformed value was used.

性別; 男=0, 女=1, # 非内服=0, 内服=1

β: standardized regression coefficients, SE: standard error.

(文献 16 より改変引用)

PETを用いて動脈硬化の炎症に関与する因子について検討した。炎症を反映するFDG集積の程度をmax standardized uptake value(SUV)を用いて定量評価し、216例を対象に動脈硬化の炎症に関与する因子について検討した。ステップワイズ重回帰分析を行うと腹部肥満、高血圧(降圧薬内服)、低HDLコレステロール、インスリン抵抗性などメタボリック症候群に関連する因子が関与しており(表1)、メタボリック症候群関連因子の重積により動脈硬化の炎症が増加することが明らかとなった(図7)¹⁹⁾。さらに、脳卒中のサロゲートマーカーであるIMTを頸動脈硬化の指標として解析を行うと、高齢、動脈炎症、高血圧、男性、スタチン内服などの因子が関与していた。動脈硬化に関与する因子と動脈硬化の炎症に関与する因子が異なることが示され(表2)、安定プラークはメタボリック症候群関連因子により不安定化することが示唆された¹⁶⁾。心血管病の臨床現場においてメタボリック症候群が動脈硬化惹起性症候群と提唱される意義を示したものである。

VII. FDG-PETによる治療効果の判定

動脈炎症の活動性が高い大動脈炎症候群例に対してステロイド治療を行い、FDG-PETにて血管炎症の活動性を評価したところ、図3Bに示すようにステロイド治療により血管炎症の活動性が抑制されたことが一目瞭然であった¹⁶⁾。

脂質低下目的に用いられるスタチンはLDLコレステロール低下作用のみでなく、全身の炎症性マーカーを軽減させることが示され、動脈硬化巣の炎症をも軽減することが報告されている。われわれはFDG-PETを用いて、抗炎症効果を有するスタチンがプラーク局所の炎症を抑制するかについて検討した¹⁷⁾。頸動脈や大動脈のプラークにFDG集積のあった例に対して3カ月間の食事療法とスタチン治療に割り付け、LDLコレステロール低下療法を行ったところ、図6に示すようにスタチン治療によりプラークのFDG集積は明らかに軽減したが、食事療

図7 メタボリック症候群の関連因子の重積と動脈炎症の関係
メタボリック症候群関連因子の重積により、動脈炎症が強くなる。
SUV: standardized uptake value : FDGの集積強度、すなわち炎症の活動性を示す。
(文献 19 より引用)

法では軽減しなかった。

VIII. 冠動脈プラークとステント留置部位の炎症活動性の評価

活動性の高い炎症の存在はプラークの不安定化要因として重要視されており、FDG-PETはプラーク炎症を検出する有力なモダリティであるが、空間分解能や時間分解能の問題から冠動脈への応用は困難であった。しかしながら、近年、MSCTとの融合画像により冠動脈プラークやステントの炎症活動性の評価をFDG-PETを用いて行うことができるようになってきた。図8は冠動脈造影とPET/CTを同時期に行った症例で、左冠動脈主幹部に25%ほどの狭窄を認め、FDG集積を認めた。器質的狭窄の程度は強くないが、FDG集積を示す炎症活動性の高い左冠動脈主幹部プラークと考え、ストロングスタチンによるコレステロール低下療法を強化し、厳重に管理している。次に、右冠動脈起始部に冠動脈瘤を有し、瘤部で

A | B | C

図8 冠動脈プラークのFDG-PET/CT画像
 高血圧と脂質代謝異常を有す、労作性狭心症例。
 A：冠動脈造影。左冠動脈主幹部に25%狭窄を認める。
 B：CT(非造影)。左冠動脈主幹部～前下降枝・回旋に石灰化を認める。
 C：PET/CT。大動脈壁(白矢印)と左冠動脈主幹部(赤矢印)にかけてFDG集積を認める。

A | B | C

図9 冠動脈瘤のFDG-PET/CT画像
 肥満と脂質代謝異常を有す、陳旧性下壁心筋梗塞症例。
 A：冠動脈造影。右冠動脈起始部に冠動脈瘤を形成し、瘤部で完全閉塞している。
 B：造影CT。右冠動脈起始部に冠動脈瘤を認める。冠動脈瘤の6時～9時方向に濃染部を認める。
 C：PET/CT。冠動脈瘤内の濃染部に一致してFDG集積を認める。

Seg. 1: 完全閉塞、冠動脈瘤(+)
 CRP 1.28 mg/dL
 ESR 70 mm/hr

図10 冠動脈ステント近位部プラークのFDG/PET画像
 右冠動脈に留置したステント近位部にプラークを認める症例。
 RCA：右冠動脈、RV：右室、LV：左室。右冠動脈のステント近位部に存在するプラークに一致してFDG集積を認める。(文献21より引用、2010 American College of Cardiology Foundation Published by Elsevier Inc. All rights reserved.)

完全閉塞していた例を示す(図9)。MSCTにて冠動脈瘤内の6時～9時方向に濃染部を認め、vasavasorumの破綻が示唆され(図9：CT)、濃染部に一致してFDGの集積が認められた(図9：PET/CT)。本症例は原因不明の血清炎症所見を示しており、冠動脈瘤部の炎症に起因する炎症所見と考えられた。

さらに、FDG-PETとMSCTを用いて安定狭心症例と急性症候群例に挿入したステント部位のFDG集積は、不安定狭心症例の方が高いことが報告されている²⁰⁾。ステ

ント挿入例では、ステントストラットが解剖学的目印となり、ステント部位の炎症やステント近位部に存在する冠動脈プラークにおける炎症を評価することも可能となる(図10)²¹⁾。経皮的冠動脈形成術後の再狭窄や薬剤溶出性ステント留置部後に起こる遅発性血栓症などの問題も炎症が関与していると言われている。経皮的冠動脈形成術を行った病変やステント留置部位の局所的な炎症を評価することは病態を理解する上でも重要であり、今後の臨床応用が期待される。

IX. おわりに

FDG-PET を用いることにより従来の検査法ではわからなかった血管壁や動脈硬化プラークの炎症が非侵襲的に可視化され、活動性や範囲の評価のみならず経時的評価や薬物療法の効果判定にも有用である。これまでに評価困難とされてきた冠動脈プラークやステント留置部位の炎症活動性についても、MSCT との融合画像により評価が可能となってきた。FDG-PET を用いることにより、動脈硬化プラークの分子レベルの挙動を非侵襲的に評価することが可能であり、さらなる臨床応用が期待される。

文 献

- 1) Ambrose JA, Tannenbaum MA, Alexopoulos D, Hjendahl-Monsen CE, Leavy J, Weiss M, Borricco S, Gorlin R, Fuster V: Angiographic progression of coronary artery disease and the development of myocardial infarction. *J Am Coll Cardiol* 1988; **12**: 56–62
- 2) Fuster V, Badimon L, Badimon JJ, Chesebro JH: The pathogenesis of coronary artery disease and the acute coronary syndromes (2). *N Engl J Med* 1992; **326**: 310–318
- 3) Falk E, Shah PK, Fuster V: Coronary plaque disruption. *Circulation* 1995; **92**: 657–671
- 4) Ridker PM, Rifai N, Pfeffer MA, Sacks F, Braunwald E: Long-term effects of pravastatin on plasma concentration of C-reactive protein. The Cholesterol and Recurrent Events (CARE) Investigators. *Circulation* 1999; **100**: 230–235
- 5) Ridker PM, Rifai N, Stampfer MJ, Hennekens CH: Plasma concentration of interleukin-6 and the risk of future myocardial infarction among apparently healthy men. *Circulation* 2000; **101**: 1767–1772
- 6) Ridker PM, Rifai N, Clearfield M, Downs JR, Weis SE, Miles JS, Gotto AM Jr; Air Force/Texas Coronary Atherosclerosis Prevention Study Investigators: Measurement of C-reactive protein for the targeting of statin therapy in the primary prevention of acute coronary events. *N Engl J Med* 2001; **344**: 1959–1965
- 7) Ross R: Atherosclerosis-an inflammatory disease. *N Engl J Med* 1999; **340**: 115–126
- 8) Tahara N, Imaizumi T, Virmani R, Narula J: Clinical feasibility of molecular imaging of plaque inflammation in atherosclerosis. *J Nucl Med* 2009; **50**: 331–334
- 9) Barger AC, Beeuwkes R, Lainey LL, Silverman KJ: Hypothesis: vasa vasorum and neovascularization of human coronary arteries. A possible role in the pathophysiology of atherosclerosis. *N Engl J Med* 1984; **310**: 175–177
- 10) Virmani R, Kolodgie FD, Burke AP, Finn AV, Gold HK, Tulenko TN, Wrenn SP, Narula J: Atherosclerotic plaque progression and vulnerability to rupture: angiogenesis as a source of intraplaque hemorrhage. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 2005; **25**: 2054–2061
- 11) Moreno PR, Falk E, Palacios IF, Newell JB, Fuster V, Fallon JT: Macrophage infiltration in acute coronary syndromes. Implications for plaque rupture. *Circulation* 1994; **90**: 775–778
- 12) van der Wal AC, Becker AE, Koch KT, Piek JJ, Teeling P, van der Loos CM, David GK: Clinically stable angina pectoris is not necessarily associated with histologically stable atherosclerotic plaques. *Heart* 1996; **76**: 312–316
- 13) Ogawa M, Ishino S, Mukai T, Asano D, Teramoto N, Watabe H, Kudomi N, Shiomi M, Magata Y, Iida H, Saji H: ¹⁸F-FDG accumulation in atherosclerotic plaques: immunohistochemical and PET imaging study. *J Nucl Med* 2004; **45**: 1245–1250
- 14) Rudd JH, Warburton EA, Fryer TD, Jones HA, Clark JC, Antoun N, Johnström P, Davenport AP, Kirkpatrick PJ, Arch BN, Pickard JD, Weissberg PL: Imaging atherosclerotic plaque inflammation with [18F]-fluorodeoxyglucose positron emission tomography. *Circulation* 2002; **105**: 2708–2711
- 15) Tawakol A, Migrino RQ, Bashian GG, Bedri S, Vermylen D, Cury RC, Yates D, LaMuraglia GM, Furie K, Houser S, Gewirtz H, Muller JE, Brady TJ, Fischman AJ: In vivo ¹⁸F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography imaging provides a noninvasive measure of carotid plaque inflammation in patients. *J Am Coll Cardiol* 2006; **48**: 1818–1824
- 16) Tahara N, Yamagishi SI, Mizoguchi M, Kond T, Kai H, Imaizumi T, Narula J: Demonstration of the Efficacy of Statins in Resolution of Plaque Inflammation by Serial FDG Imaging. *Immun Endoc & Metab Agents in Med Chem* 2008; **8**: 183–188
- 17) Tahara N, Kai H, Ishibashi M, Nakaura H, Kaida H, Baba K, Hayabuchi N, Imaizumi T: Simvastatin attenuates plaque inflammation: evaluation by fluorodeoxyglucose positron emission tomography. *J Am Coll Cardiol* 2006; **48**: 1825–1831
- 18) Tahara N, Kai H, Nakaura H, Mizoguchi M, Ishibashi M, Kaida H, Baba K, Hayabuchi N, Imaizumi T: The prevalence of inflammation in carotid atherosclerosis: analysis with fluorodeoxyglucose-positron emission tomography. *Eur Heart J* 2007; **28**: 2243–2248
- 19) Tahara N, Kai H, Yamagishi S, Mizoguchi M, Nakaura H, Ishibashi M, Kaida H, Baba K, Hayabuchi N, Imaizumi T: Vascular inflammation evaluated by [18F]-fluorodeoxyglucose positron emission tomography is associated with the metabolic syndrome. *J Am Coll Cardiol* 2007; **49**: 1533–1539
- 20) Rogers IS, Nasir K, Figueroa AL, Cury RC, Hoffmann U, Vermylen DA, Brady TJ, Tawakol A: Feasibility of FDG imaging of the coronary arteries: comparison between acute coronary syndrome and stable angina. *JACC Cardiovasc Imaging* 2010; **3**: 388–397
- 21) Rudd JH, Narula J, Strauss HW, Virmani R, Machac J, Klimas M, Tahara N, Fuster V, Warburton EA, Fayad ZA, Tawakol AA: Imaging atherosclerotic plaque inflammation by fluorodeoxyglucose with positron emission tomography: ready for prime time? *J Am Coll Cardiol* 2010; **55**: 2527–2535